

Pitanja za radno mjesto – Ljekar specijalista ginekolog

1. Najčešći uzrok anemije u trudnoći je?
2. Najvažniji faktor pomoći u drugom porođajnom dobu je:
3. Jajnik:
4. Prije nego se započne sa instrumentalnim dovršetkom poroda potrebno je utvrditi sljedeće:
5. Rizik za nastanak karcinoma endometrija je:
6. Najčešći uzročnici premalignih promjena na grliću su:
7. Najbolja prevencija nastanka karcinoma grlića maternice jeste:
8. Papa test pokaže Ca in situ, šta su sljedeći koraci:
9. Abrupcija posteljice je:
10. Ukoliko postoje kontrakcije uterusa, koja od navedenih dilatacija predstavlja početak aktivne faze poroda?
11. Ovulacija u ciklusu koji traje 25 dana događa se najvjeroatnije koji dan?
12. Treći stadij poroda ili treće porođajno doba:
13. Koja anatomska struktura pruza najveću potporu uterusu i grlicu uterusu?
14. Slučaj: „ U prijemnu ambulantu Vam dolazi 24-godišnja pacijentica, nulipara sa bolovima u donjem lijevom kvadrantu abdomena. U laboratorijskim nalazima vrijednosti beta HCGa je 16 000 mIU/ml. Transvaginalnim ultrazvučnim pregledom vizualizira se ektopična trudnoća promjera 3cm bez vidljive srčane akcije ploda. Koji je najbolji naredni korak u menadžmentu? „
15. Pacijentice sa potvrđenom upalnom zdjeličnom bolešću (PID) se mogu javiti sa bolovima ispod DRL. Koja je navjerovatnija etiologija?
16. Koja od sljedećih benignih adneksalnih masa potiče od sva tri sloja germinativnih ćelija?
17. Koja od navedenih tvrdnji je najtačnija za spontani pobačaj?
18. Koji od navedenih simptoma je najmanje povezan sa menopauzom?
19. Koji od nabrojanih nije rizik faktor za razvoj endometrijalnog karcinoma?
20. Koji je odgovarajući korak u dalnjem menadžmentu pacijentica u reproduktivnoj dobi nakon jednostrane adneksektomije i patohistoloski verificiranog borderline tumora (niskog malignog potencijala)?
21. Koja od navedenih tvrdnji je tačna?
22. Chorioamnionitis je najčešće uzrokovan sa?
23. U porodilište primate drugorotku u 36-toj nedjelji gestacije u aktivnom porodu. Vaginalni bris jos uvijek nije urađen. Šta radite?
24. Koje od navedenih stanja kod trudnica je povezano sa 50% većim maternalnim morbiditetom na porodu?
25. Nekontrolisana i neliječena oboljenja stitne zlijezde kod trudnica su povezana sa kojim komplikacijama u trudnoći?
26. Koja od navedenih metoda je apsolutno kontraindicirana za indukciju poroda nakon carskog reza?
27. Koja od navedenih tvrdnji vezanih za opštu endotrahealnu anesteziju u trudnoći nije tačna?
28. Zaokruži tačnu tvrdnju.
29. Lijek izbora kod dokazane infekcije Trichomonas vaginalis u 30oj nedjelji gestacije je:

30. Trudnica u 10oj nedjelji gestacije uradi TORCH test koji pokaže da nije imuna na Rubella virus. Sta preporučujute?

Literatura:

- Ginekologija: Simunić ginekologija
- Porodiljstvo od Kurjaka i saradnika
- Williams Obstetrics