

Ljekar radiolog prati tok kontrasta i vrši se ciljano radiografsko snimanje. U toku samog snimanja-ekspozicije pacijent će biti zamoljen da ne diše i da se ne miče. Pregled traje oko pola sata.

Peroralna apendikografija

Ovo je metoda pomoću koje se otkrivaju patološke promjene na apendiku (crvuljku).

Priprema pacijenta

Pacijent prilikom narudžbe za pregled dobije pripremljenu kontrastnu suspenziju barijum sulfata koju mora popiti na sljedeći način:

Dan uoči pregleda

U 8 sati ujutro popiti pola pripremljenog kontrasta.

U 16 sati popiti dvije tablete Dulkolax-a.

U 20 sati popiti preostali kontrast.

Na pregled treba doći natašte, tj. ništa piti niti jesti poslije 20 sati do samog pregleda.

Pregled se obavlja u jutarnjim satima. Pomoću ove pripreme se kontrastno prikazuje appendix čime se omogućava da radiolog dijagnosticira eventualne patološke promjene.

Peroralna ileocekokografija

Ova pretraga je kontrastni pregled završnog dijela tankog crijeva (ileuma) i debelog crijeva (cecum) pomoću kontrasta suspenzije barijuma koji se daje per os (kroz usta).

Priprema pacijenta

Priprema je ista kao za irigografiju. Pacijent će popiti kontrast u jutarnjim satima prije početka pregleda. Kasnije radiolog prati kontrastno prikazani ileum i cecum radi dijagnosticiranja mogućih patoloških promjena.



JU Opća bolnica
„Prim.dr. Abdullah Nakaš“
Kranjčevićeva 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina



Telefonska centrala
+387 33 285-100

Fax
+387 33 285-370

Web adresa
www.obs.ba

e-mail
info@obs.ba




Odjeljenje za radiologiju

PRIPREMA ZA RADILOŠKE PRETRAGE DIGESTIVNOG TRAKTA (II)

Irigografija

Peroralna apendikografija
Peroralna ileocekokografija

Informacije za pacijente



Pripremio

Viši rtg teh. Adnan Pajević

Obrada

Odjeljenje za bibliotečku, informacionu i edukacionu djelatnost


Savjeti pacijentima za pretrage

Prije svake radiološke pretrage potrebno je obavijestiti lječara u slučaju da ste alergični na pojedine lijekove i kontrastna sredstva.

Dobra priprema je neophodna za kvalitetan pregled digestivnog trakta, jer bilo kakvi ostaci u organima probave prave lažne sjene pri pregledu pa se kod takvih pacijenata neće moći izvršiti pregled kako treba ili će biti vraćeni na ponovno pripremanje.

Šta je digestivni trakt?

Probavni ili digestivni trakt je sistem organa za varenje.



Digestivni trakt čine: usna duplja, koja se preko ždrijela (farinks) nastavlja u jednjak (ezofagus) i dalje u želudac (gaster). Želudac nastavlju tanka crijeva–dvanaestopalačno (duodenum), jejunum i ileum. Završni dio probavnog trakta je debelo crijevo, dugo 1,5 do 3 metra, koje završava analnim otvorom.

Digestivnom traktu pripadaju i dva žlijezdana organa : jetra (hepar) i gušterača (pankreas).

Vrste pretraga digestivnog trakta

- pasaža jednjaka
- rendgen gastroduodenuma
- pasaža tankog crijeva
- irigografija
- peroralna apendikografija
- peroralna ileocekografija

Kontrast koji se upotrebljava pri pregledima digestivnog trakta

Kao kontrastno sredstvo u radiološkoj dijagnostici organa za varenje upotrebljava se barijum sulfat koji se ne resorbuje već se fecesom izbacuje iz organizma.

U slučaju sumnje na perforaciju organa digestivnog trakta daje se sterilno kontrastno sredstvo Gastrografin.

Vrste pretraga

Irigografija

Irigografija je kontrastni pregled debelog crijeva. Pregled se obavlja davanjem suspenzije barijum sulfata per rectum (preko čmara) klizmom.

Priprema pacijenta

Za radiološki pregled kolona (debelog crijeva) pacijent se treba pažljivo pripremiti.

Dva dana prije pregleda mora se primijeniti trodnevni dijetalni režim ishrane.

1. dan

- lagani doručak (prepečen hljeb, čaj, puter)
- lagani ručak (nemasna supa, krompir pire, piletina)
- lagana večera (kompot od šljiva)

2. dan (dan uoči pregleda)

- lagani doručak (kao gore)
- u 15 sati popiti čitav sirup Colocleans ili tri tablete Dulkolax-a.
- U toku dana popiti 3-4 litre bistre tečnosti (voda, čaj, kafa bez mlijeka, bistro sokovi)
- U 20 sati popiti čitav sirup Coloklens ili tri tablete Dulkolax-a.

Ne večerati, ništa ne piti.

Ako imate problema sa stolicom npr. zatvor onda se mora uzeti ricinusovo ulje i to po dvije kašike, nekoliko puta na dan.

3. dan (dan pregleda)

- ništa ni jesti ni piti

Pregled se obavlja tako što pacijent skine svu odjeću i legne na stol za pregled (za vrijeme dok se ne snima pokriven je plahtom).

Priprema za sami tok pregleda

Rentgen tehničar stavlja tanku cijev u anus pacijenta nakon čega se ubrizga barijum kroz aparat koji se zove pneumokolon. Za vrijeme pregleda pacijent treba da stisne mišiće anusa da ne bi pustio barijum da izade van.



Sl.1. Irigografija