

Pitanja za radno mjesto Ljekar specijalista maksilofacijalne hirurgije

1. Predispozicije za komplikacije koje nastaju poslije ekstrakcije zuba:
2. Oroantralna komunikacija nakon ekstrakcije zuba se liječi:
3. Ciste nastale usljed poremećaja u razvitku (odonotgene) su:
4. Hirurška korekcija rascjepa usne i nepca najčešće se izvodi:
5. Le Fort I osteotomija omogućava:
6. Za resekciju karcinoma stražnjeg dijela jezika najoptimalniji je:
7. M. pectoralis major - miokutani flap je:
8. Radiografska metoda izbora za prikaz conchae bullosae i Hallerove ćelije je:
9. Tretman karcinoma poda usne duplje:
10. Termin „Pott puffy tumor“ odnosi se na:
11. Od sarkoma mekih tkiva lica i vilice najčešće se javljaju:
12. Lateralna – branhiogena cista i fistula vrata nastaje:
13. Hirurško liječenje disgnatija se preporučuje:
14. U tretmanu frakture zigomatične kosti sa minimalnom dislokacijom primjenjujemo:
15. U slučaju hirurškog tretmana ekstenzivne Le Fort II frakture ukoliko je potreban širi pristup na nazoetmoidni kompleks najčešće primjenjujemo:
16. Morbus Bowen karakteriše:
17. Regionalne metastaze karcinoma usne šupljine najprije zahvataju:
18. Supraomohoidna disekcija je:
19. Za perimandibularni apsec je tačno:
20. Warthin tumor je:

Literatura:

Ballenger's Otorhinolaryngology, Head and neck Surgery; James B.Snow, P.Ashley Wackym. BC Decker Inc; 2009.

Kirurgija glave i vrata; Ivo Čupar. Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti; Zagreb, 1975.

Maksilofacijalna hirurgija; Aleksa Piščević, Miodrag Gavrić, Ivan Sjerobabin. Mikroknjiga d.o.o; Beograd; 2001.

Maksilofacijalna kirurgija; Ivica Lukšić i suradnici. Naklada Ljevak d.o.o.; Zagreb; 2019.